

NUTRILON АНТИРЕФЛЮКС

ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ

Маса нетто 300 g (г) Е

ОПИС

Функціональне дитяче харчування
Суміш молочна суха Nutrilon Антирефлюкс
для харчування дітей від народження
Nutricia Nutrilon™

300 g (г) = 12 порцій

Зменшує зригування

Антирефлюкс зменшує зригування у дітей
завдяки вмісту натуральної камеді

Від народження

Упаковано в захисному середовищі

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Безумовна перевага належить грудному
вигодовуванню. Перед початком годування
дитини віком до одного року необхідно
проконсультуватися з лікарем.

Забороняється використання води з
колодязів і каптажних джерел для
приготування дитячого харчування. Не
використовувати в харчуванні дітей, що
мають алергію на будь-який з компонентів
продукту. Недотримання інструкцій для
приготування суміші може завдати шкоди.
Не залишайте дитину на самоті під час
годування. Перехід на нову формулу
молочної суміші має проводитись
поступово. Проконсультуйтеся з лікарем.
Будь ласка, доглядайте за першими зубками
малюка, особливо перед сном.

ВИРОБНИК

«Nutricia Zakłady Produkcyjne» Sp.z o.o, ul.
Marka z Jemielnicy 1, 45–952, Opole, Polska
(ТОВ «Нутриція Заклади Продукційне», вул.
Марка з Ємельниці 1, 45–952, м. Ополе,
Польща)

ІМПОРТЕР

ТОВ з іноземними інвестиціями «Нутриція
Україна»,
вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корпус 2, м. Київ,
04080, Україна,
тел. 0 800 50 17 85 (09:00–19:00, безкоштовно
в Україні).

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

18 місяців

ЯК ЗБЕРІГАТИ

Невідкриту упаковку з сумішшю
зберігати у сухому і прохолодному місці
за температури від +5 °С до +25 °С та
відносної вологості не більше ніж 75%.

Після відкриття зберігайте суміш у сухому
прохолодному місці, але не в
холодильнику, щільно закритою за
температури від +5 °С до +25 °С та
відносної вологості не більше ніж 75%.
Суміш слід використати протягом одного
місяця після відкриття упаковки.



ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ГОДУВАННЯ

Використання некип'яченої, нечистої, непитної води, а також нестерильної пляшечки або соски може завдати шкоди здоров'ю дитини. Розведену суміш слід використати протягом двох годин. Ніколи не використовуйте залишки розведеної порції для наступного годування. Не розігрівайте розведену суміш у мікрохвильовій печі. Дотримуйтеся інструкцій: не збільшуйте кількість мірних ложечок на одну порцію та не додавайте нічого в готову суміш.

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ 100 ml (мл) СУМІШІ

1. Ретельно вимийте руки та простерилізуйте пляшечку і соску.
2. Прокип'ятіть чисту питну воду впродовж 10 хвилин. Залиште її на 30 хвилин для охолодження приблизно до +40 °C.
3. Відміряйте 90 ml (мл) кип'яченої води та налийте її в простерилізовану пляшечку. Не використовуйте повторно кип'ячену воду.
4. Використовуючи мірну ложечку, що додається, відміряйте 3 ложечки суміші (1 ложечка = 4,5 g (г), зніміть надлишки суміші за допомогою тильної сторони ножа).
5. Додайте до кип'яченої води точну кількість мірних ложечок суміші. Занадто велика або мала кількість мірних ложечок суміші може завдати шкоди. Орієнтовний добовий об'єм їжі можна визначити за допомогою таблиці добової потреби в їжі на упаковці або на сайті pronutrilon.com.
6. Щільно закрийте пляшечку та добре збовтайте її протягом 20 секунд до повного розчинення порошку. Намагайтесь мінімізувати перерву між додаванням суміші до кип'яченої води та її збовтуванням. Зніміть кришку і вдягніть на пляшечку підготовлену стерильну соску.
7. Перед годуванням залиште продукт на 7 хвилин, щоб він загуснув.
8. Переверніть пляшечку догори дном та перевірте температуру готового харчування на тильному боці зап'ястя (+37 °C) перед використанням.

РЕКОМЕНДОВАНА ТАБЛИЦЯ ДОЗУВАННЯ

Ваш малюк може потребувати менше або більше суміші, ніж це показано в рекомендованій таблиці дозування. Звертайтеся за порадами до лікаря в разі виникнення запитань. Необхідно пам'ятати, що кількість їжі, яка використовується на одне годування, не завжди однакова впродовж дня.

Вік дитини	Орієнтовний добовий об'єм їжі, ml (мл)	Приклад розрахунку орієнтовного добового об'єму їжі
0-10 днів	70-80 ml (мл) × день життя новонародженого	5 день життя малюка: 70 ml (мл) × 5 = 350 ml (мл)
10 днів-2 місяці	1/5 маси тіла *	Маса тіла малюка 3000 g (г): 3000 g (г) / 5 = 600 ml (мл)
2-4 місяці	1/6 маси тіла *	Маса тіла малюка 4200 g (г): 4200 g (г) / 6 = 700 ml (мл)
4-6 місяців	1/7 маси тіла *	Маса тіла малюка 6300 g (г): 6300 g (г) / 7 = 900 ml (мл)
6-12 місяців	1/8 – 1/9 маси тіла *	Маса тіла малюка 8000 g (г): 8000 g (г) / 8 = 1000 ml (мл)

* за умови, що маса тіла малюка відповідає середній віковій нормі

Часто через анатомо-фізіологічні особливості розвитку у дітей перших місяців життя можуть спостерігатись зригування. Із подібними розладами можна ефективно боротись за допомогою дієтотерапії. Nutrilon Антирефлюкс допоможе зменшити частоту і важкість зригувань. Завдяки камеді, довголанцюговим поліненасиченим жирним кислотам та співвідношенню білків альбуміну та казеїну 40:60 суміш допомагає покращити роботу травної системи. Суміш Nutrilon Антирефлюкс в залежності від рекомендацій лікаря може призначатись:

- із грудним вигодовуванням – суміш Nutrilon Антирефлюкс застосовується перед годуванням груддю;
- з іншою сумішшю – суміш Nutrilon Антирефлюкс готується в окремій пляшечці та застосовується перед годуванням основною сумішшю (не змішуючи їх);
- для повного харчування малюка як основною сумішшю.

Суміш Nutrilon Антирефлюкс не має обмежень щодо тривалості застосування

Безкоштовна консультація педіатра

Лінії підтримки батьків NUTRICIA

0 800 50 17 85

(дзвінки зі стаціонарних телефонів по Україні безкоштовні)

СКЛАД

Лактоза (з коров'ячого молока) (34%), рослинні олії (пальмова, кокосова, рапсова, соняшникова, високоолеїнова соняшникова), **знежирене молоко** (20,7%), **демінералізована сироватка (з коров'ячого молока)** (13,4%), згущувач (камедь бобів ріжкового дерева), **сироватковий концентрат (з коров'ячого молока)**, фосфат кальцію, **риб'ячий жир, сироватковий білок (з коров'ячого молока)**, цитрат натрію, олія з *Mortierella alpina*, хлорид холіну, хлорид калію, L-аскорбінова кислота, цитрат калію, хлорид магнію, **емульгатор (соєвий лецитин)**, інозитол, таурин, сульфат заліза, L-триптофан, сульфат цинку, L-карнітин, натрієва сіль уридин 5'-монофосфату, ацетат DL-альфа-токоферолу, цитидин 5'-монофосфат, карбонат кальцію, натрієва сіль інозин 5'-монофосфату, D-пантотенат кальцію, аденозин 5'-монофосфат, нікотинамід, натрієва сіль гуанозин 5'-монофосфату, сульфат міді, DL-альфа-токоферол, ретинілпальмітат, гідрохлорид тіаміну, гідрохлорид піридоксину, рибофлавін, фолієва кислота, йодид калію, сульфат марганцю, селеніт натрію, фітоменадіон, холекальциферол, D-біотин, ціанокобаламін. Без ГМО.

ТАБЛИЦЯ ПОЖИВНОЇ ЦІННОСТІ

Поживна цінність	на 100 g (г) сухого порошку	на 100 ml (мл) готової суміші (13,37 g (г) порошку)
Енергетична цінність, kJ (кДж)/kcal (ккал)	2066/494	276/66
Жири, g (г) з них:	25,1	3,4
Насичені жири, g (г)	11,2	1,5
Пальмітинова кислота, g (г)	4,6	0,61
Омега-3		
α-ліноленова кислота, mg (мг)	400	53,8
Ейкозапентаєнова кислота, mg (мг)	30	3,6
Докозагексаєнова кислота, mg (мг)	120	16,5
Омега-6		
Лінолева кислота, mg (мг)	3400	449
γ-ліноленова кислота, mg (мг)	10	1,2
Арахідонова кислота, mg (мг)	120	16,5
Вуглеводи, g (г), з них:	55,6	7,4
Цукри, g (г)	54,7	7,3
Лактоза, g (г)	54,6	7,31
Білки, g (г), з них:	9,9	1,3
Співвідношення сироватковий білок:казеїн	40:60	40:60
Сіль*, g (г)	0,41	0,05
Харчові волокна, g (г)	3,0	0,4

ТАБЛИЦЯ ПОЖИВНОЇ ЦІННОСТІ

Поживна цінність	на 100 g (г) сухого порошку	на 100 ml (мл) готової суміші (13,37 g (г) порошку)
Мінеральні речовини		
Натрій (Na), mg (мг)	163	21,8
Калій (K), mg (мг)	528	71
Хлориди (Cl), mg (мг)	380	51
Кальцій (Ca), mg (мг)	591	79
Фосфор (P), mg (мг)	383	51
Магній (Mg), mg (мг)	38	5,1
Залізо (Fe), mg (мг)	5,9	0,79
Цинк (Zn), mg (мг)	4,7	0,63
Мідь (Cu), µg (мкг)	390	52
Марганець (Mn), µg (мкг)	26	4
Фториди (F), µg (мкг)	<=44	<=5,9
Молибден (Mo), µg (мкг)	<=44	<=5,9
Селен (Se), µg (мкг)	22	3,0
Хром (Cr), µg (мкг)	<=44	<=5,9
Йод (I), µg (мкг)	94	13
Вітаміни		
Вітамін А, µg RE (мкг RE)	432	58
Вітамін D3, µg (мкг)	12	1,6
Вітамін Е, mg α-TE (мг α-ТЕ)	8,2	1,1
Вітамін К, µg (мкг)	33	4,4
Тіамін (B1), mg (мг)	0,50	0,07
Рибофлавін (B2), mg (мг)	1,0	0,14
Ніацин (включаючи триптофан) (B3), mg NE (мг NE)	3,2	0,43
Пантотенова кислота (B5), mg (мг)	3,95	0,53
Вітамін В6, µg (мкг)	348	46
Фолати, µg (мкг)	103	14
Фолієва кислота, µg (мкг)	62	8,3
Вітамін В12, µg (мкг)	0,62	0,08
Біотин, µg (мкг)	12	1,7
Вітамін С, mg (мг)	69	9,2
Інші нутрієнти		
Нуклеотиди, mg (мг)	17	2,3
L-карнітин, mg (мг)	16	2,1
Холін, mg (мг)	163	22
Інозитол, mg (мг)	54	7,3
Таурин, mg (мг)	40	5,3
Осмолярність, mOsmol/l (мОсмоль/л)		270
Осмоляльність, mOsmol/kg water (мОсмоль/кг води)		300
Потенційне ниркове навантаження, mOsmol/l (мОсмоль/л)		134

* наявність солі зумовлена виключно вмістом натрію природного походження