

NUTRILON КИСЛОМОЛОЧНИЙ 1

ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ВІД 0 ДО 6 МІСЯЦІВ

Маса нетто 400 g (г) Е

ОПИС

Дитяча суміш початкова суха Nutrilon
Кисломолочний 1, для дітей від 0 до 6 місяців
Упаковано в захисному середовищі

400 г (г) = 16 порцій*

*Індивідуальна кількість порцій залежить від
консультації з лікарем та наданих
рекомендацій

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Безумовна перевага належить грудному
вигодовуванню. Перед початком годування
дитини віком до одного року необхідно
проконсультуватися з лікарем.

Забороняється використання води з
колодязів і каптажних джерел для
приготування дитячого харчування. Не
використовувати в харчуванні дітей, що
мають алергію на будь-який з компонентів
продукту. Недотримання інструкцій для
приготування суміші може завдати шкоди.
Не залишайте дитину на самоті під час
годування. Перехід на нову формулу
молочної суміші має проводитись
покроково. Слідкуйте за ротовою
порожниною малюка під час появи перших
зубів, особливо перед сном.

Дитяча суміш призначена для дітей грудного
віку від народження, якщо вони не
годуються грудним молоком.

ВИРОБНИК

«Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp.z.o.o», ul.
Marka z Jemielnicy 1, 45–952, Opole, Polska
(ТОВ «Нутриція Заклади Продукційне», вул.
Марка з Ємельниці 1, 45–952, м. Ополе,
Польща)

ІМПОРТЕР

ТОВ з іноземними інвестиціями «Нутриція
Україна»,
вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корпус 2, м. Київ,
04080, Україна,
тел. 0 800 50 17 85 (09:00–19:00, безкоштовно
в Україні).

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

18 місяців

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Перед відкриттям: суміш зберігати в
оригінальній упаковці у сухому і
прохолодному місці при температурі від
5° до 25 °С та відносній вологості не
більше 75%, але не в холодильнику.

Після відкриття: зберігайте суміш щільно
закритою у сухому прохолодному місці,
але не в холодильнику, та використовуйте
протягом одного місяця.



ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ГОДУВАННЯ

Використання некип'яченої, нечистої, непитної води, а також нестерильної пляшечки або соски може завдати шкоди здоров'ю дитини. Рекомендуємо використовувати спеціальну бутильовану воду для приготування дитячого харчування. Ніколи не використовуйте для наступного годування залишки розведеної порції. Розведену суміш слід використати протягом 2 годин після приготування. Заборонено розігрівати розведену суміш у мікрохвильовій печі. Дотримуйтеся інструкцій: не збільшуйте кількість мірних ложечок на одну порцію та не додавайте нічого в готову суміш. Використовувати тільки мірну ложечку, що поставляється разом із пакуванням.

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ 100 ml (мл) СУМІШІ

1. Ретельно вимийте руки та простерилізуйте пляшечку і соску.
2. Прокип'ятіть чисту питну воду впродовж 10 хвилин. Залиште її на 30 хвилин для охолодження приблизно до +40°C.
3. Відміряйте 90 ml (мл) кип'яченої води та налейте її в простерилізовану пляшечку. Не використовуйте повторно кип'ячену воду.
4. Використовуючи мірну ложечку, що додається, відміряйте 3 ложечки суміші (1 ложечка = 4,6 g (г), зніміть надлишки суміші за допомогою тильної сторони ножа).
5. Додайте до кип'яченої води точну кількість мірних ложечок суміші. Занадто велика або мала кількість мірних ложечок суміші може завдати шкоди. Орієнтовний добовий об'єм їжі можна визначити за допомогою таблиці добової потреби в їжі на упаковці або на сайті pronutrilon.com.
6. Закрийте пляшечку та добре збовтайте її протягом 10 секунд. На стінках пляшечки можливі дрібні залишки нерозчинених компонентів суміші. Зніміть кришку і вдягніть на пляшечку підготовлену стерильну соску.
7. Перевірте температуру готового харчування на тильному боці зап'ястя (+37 °C).

ТАБЛИЦЯ ДОЗУВАННЯ

Ваш малюк може потребувати менше або більше суміші, ніж це показано в рекомендованій таблиці дозування. Точну кількість молочної суміші, яка потрібна вашому малюку, допоможе визначити лікар. Необхідно пам'ятати, що кількість їжі, яка використовується на одне годування, не завжди однакова впродовж дня.

Вік дитини	Орієнтовний добовий об'єм їжі, ml (мл)	Приклад розрахунку орієнтовного добового об'єму їжі
0-10 днів	70-80 мл (ml) × день життя новонародженого	5 день життя малюка: 70 мл (ml) × 5 = 350 мл (ml)
10 днів — 2 місяці	1/5 маси тіла*	Маса тіла малюка 3000 г (g): 3000 г (g) / 5 = 600 мл (ml)
2-4 місяці	1/6 маси тіла*	Маса тіла малюка 4200 г (g): 4200 г (g) / 6 = 700 мл (ml)
4-6 місяців	1/7 маси тіла*	Маса тіла малюка 6300 г (g): 6300 г (g) / 7 = 900 мл (ml)

* за умови, що маса тіла малюка відповідає середній віковій нормі

Безкоштовна консультація педіатра на

Лінії підтримки батьків NUTRICIA

0 800 50 17 85

(дзвінки зі стаціонарних телефонів по Україні безкоштовні)

Nutrilon Кисломолочний

Вироблений шляхом ферментації закваскою, що містить біфідо- та лактобактерії.

Містить незамінні жирні кислоти потрібні для нормального росту та розвитку дітей. (*на третій день від народження)

СКЛАД

Сироватка молочна демінералізована (з коров'ячого молока) – 23,9%, суміш рослинних олій (пальмова, ріпакова, кокосова, соняшникова олія з високим вмістом олеїнової кислоти, соняшникова, олія з одноклітинних організмів), **знежирене коров'яче молоко** – 17,6%, мальтодекстрин – 16,8%, крохмаль кукурудзяний, крохмаль картопляний, **концентрат сироватковий (з коров'ячого молока)** – 4,5%, **емульгатор лецитини (соєвий лецитин)**, кальцію гідроксид, **риб'ячий жир**, калію хлорид, калію цитрат, L-аскорбінова кислота, холіну цитрат, натрію гідроксид, магнію хлорид, заліза сульфат, інозитол, таурин, цинку сульфат, уридин 5'-монофосфат і його натрієва сіль, цитидин 5'-монофосфат, нікотинамід, аденозин 5'-монофосфат, інозин 5'-монофосфат і його натрієва сіль, ретинілу ацетат, закваска (*B. breve*, *S. thermophilus*), гуанозин 5'-монофосфат і його натрієва сіль, натрію L-аскорбат, DL-альфа токоферолу ацетат, D-пантотенат кальцію, сульфат міді, піридоксину гідрохлорид, тіаміну гідрохлорид, рибофлавін, марганцю сульфат, йодид калію, фолієва кислота, філохінон (фітоменадіон), D-біотин, натрію селеніт, вітамін D, ціанокобаламін.

ТАБЛИЦЯ ПОЖИВНОЇ ЦІННОСТІ

Поживна цінність	Одиниці	на 100 г (g) сухого порошку	на 100 мл (ml) готової суміші
Енергетична цінність	кДж (kJ)	2041	284
	ккал (kcal)	486	68
Жири, з них:	г (g)	23,1	3,2
- Насичені жири	г (g)	9,4	1,3
Омега-3			
α-ліноленова (ALA)	мг (mg)	575	80
Ейкозапентаєнова кислота (EPA)	мг (mg)	9	1,3
Докозагексаєнова кислота (DHA)	мг (mg)	44	6,1
Омега-6			
Лінолева кислота (LA)	мг (mg)	3110	433
Арахідонова кислота (AA)	мг (mg)	44	6,1
Вуглеводи, з них:	г (g)	59,7	8,3
- Цукри, з них:	г (g)	33,7	4,7
- Лактоза	г (g)	31,1	4,3
Білки:	г (g)	9,8	1,4
- Казеїн	г (g)	4,9	0,7
- Сироватковий білок	г (g)	4,9	0,7
Ступінь гідролізу		Частковий	
Мінеральні речовини			
- Натрій (Na)	мг (mg)	129	18
- Калій (K)	мг (mg)	548	76
- Хлор (Cl)	мг (mg)	311	43
- Кальцій (Ca)	мг (mg)	384	53
- Фосфор (P)	мг (mg)	240	33
- Магній (Mg)	мг (mg)	35	4,8
- Залізо (Fe)	мг (mg)	4,8	0,7
- Цинк (Zn)	мг (mg)	4,6	0,6
- Мідь (Cu)	мкг (µg)	313	44
- Марганець (Mn)	мкг (µg)	78	11
- Селен (Se)	мкг (µg)	8,7	1,2
- Йод (I)	мкг (µg)	146	20
Вітаміни			
- Вітамін А	мкг (µg) RE	372	52
- Вітамін D	мкг (µg)	8,7	1,2
- Вітамін Е	мг (mg) α-TE	4,5	0,63
- Вітамін К	мкг (µg)	50	7
- Тіамін (B1)	мкг (µg)	501	69,7
- Рибофлавін (B2)	мкг (µg)	1089	151
- Ніацин (B3)	мкг (µg)	4800	660
- Пантотенова кислота (B5)	мкг (µg)	2494	347
- Вітамін B6	мкг (µg)	611	85
- Фолієва кислота	мкг (µg)	86	12
- Вітамін B12	мкг (µg)	1,4	0,19
- Біотин	мкг (µg)	21	2,9
- Вітамін С	мг (mg)	62	8,6
Інші поживні речовини			
Нуклеотиди	мг (mg)	24	3,3
L-карнітин	мг (mg)	10	1,4
Холін	мг (mg)	79	11
Інозитол	мг (mg)	35	4,9
Таурин	мг (mg)	20	2,8