

NUTRILON КИСЛОМОЛОЧНИЙ 2

ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ВІД 6 ДО 12 МІСЯЦІВ

Маса нетто 400 г (г) Е

ОПИС

Дитяча суміш початкова суха Nutrilon Кисломолочний 2, для дітей від 6 до 12 місяців

Упаковано в захисному середовищі

400 г (г) = 16 порцій*

*Індивідуальна кількість порцій залежить від консультації з лікарем та наданих рекомендацій

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Безумовна перевага належить грудному вигодовуванню. Перед початком годування дитини віком до одного року необхідно проконсультуватися з лікарем.

Забороняється використання води з колодязів і каптажних джерел для приготування дитячого харчування. Не використовувати в харчуванні дітей, що мають алергію на будь-який з компонентів продукту. Недотримання інструкцій для приготування суміші може завдати шкоди. Не залишайте дитину на самоті під час годування. Перехід на нову формулу молочної суміші має проводитись поступово. Слідкуйте за ротовою порожниною малюка під час появи перших зубів, особливо перед сном. Суміш суха кисломолочна є лише частиною різноманітного харчування дитини. Суміш Nutrilon Кисломолочний 2 не має використовуватись як заміник грудного молока протягом перших шести місяців життя.

ВИРОБНИК

«Nutricia Zaklady Produkcyjne Sp.z.o.o», ul. Marka z Jemielnicy 1, 45–952, Opole, Polska (ТОВ «Нутриція Заклади Продукційне», вул. Марка з Ємельниці 1, 45–952, м. Ополе, Польща)

ІМПОРТЕР

ТОВ з іноземними інвестиціями «Нутриція Україна», вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корпус 2, м. Київ, 04080, Україна, тел. 0 800 50 17 85 (09:00–19:00, безкоштовно в Україні).

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяців

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Перед відкриттям: суміш зберігати в оригінальній упаковці у сухому і прохолодному місці при температурі від 5° до 25 °С та відносній вологості повітря не більше 75%,.

Після відкриття: зберігайте суміш щільно закритою у сухому прохолодному місці, але не в холодильнику, та використовуйте протягом одного місяця.



ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ГОДУВАННЯ

Використання некип'яченої, нечистої, непитної води, а також нестерильної пляшечки або соски може завдати шкоди здоров'ю дитини. Рекомендуємо використовувати спеціальну бутильовану воду для приготування дитячого харчування. Ніколи не використовуйте для наступного годування залишки розведеної порції. Розведену суміш слід використати протягом 2 годин після приготування. Заборонено розігрівати розведену суміш у мікрохвильовій печі. Дотримуйтеся інструкцій: не збільшуйте кількість мірних ложечок на одну порцію та не додавайте нічого в готову суміш. Використовувати тільки мірну ложечку, що поставляється разом із пакуванням.

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ 100 ml (мл) ГОТОВОЇ СУМІШІ

1. Ретельно вимийте руки та простерилізуйте пляшечку і соску.
2. Прокип'ятіть чисту питну воду впродовж 10 хвилин. Залиште її на 30 хвилин для охолодження приблизно до +40°C.
3. Відміряйте 90 ml (мл) кип'яченої води та налейте її в простерилізовану пляшечку. Не використовуйте повторно кип'ячену воду.
4. Використовуючи мірну ложечку, що додається, відміряйте 3 ложечки суміші (1 ложечка = 4,7 g (г), зніміть надлишки суміші за допомогою тильної сторони ножа).
5. Додайте до кип'яченої води точну кількість мірних ложечок суміші. Занадто велика або мала кількість мірних ложечок суміші може завдати шкоди. Орієнтовний добовий об'єм їжі можна визначити за допомогою таблиці добової потреби в їжі на упаковці або на сайті pronutrilon.com.
6. Закрийте пляшечку та добре збовтайте її протягом 10 секунд. На стінках пляшечки можливі дрібні залишки нерозчинених компонентів суміші. Зніміть кришку і вдягніть на пляшечку підготовлену стерильну соску.
7. Перевірте температуру готового харчування на тильному боці зап'ястя (+37 °C).

ТАБЛИЦЯ ДОЗУВАННЯ

Ваш малюк може потребувати менше або більше суміші, ніж це вказано в таблиці рекомендованого дозування. Точну кількість суміші, яка потрібна вашому малюку, допоможе визначити лікар.

Вік дитини	Орієнтовний добовий об'єм їжі, мл (ml)	Приклад розрахунку орієнтовного добового об'єму їжі
Від 6 до 12 місяців	1/8 — 1/9 маси тіла*	Маса тіла малюка 8000 г (g): 8000 г (g) / 8 = 1000 мл (ml)

* за умови, що маса тіла малюка відповідає середній віковій нормі

Безкоштовна консультація педіатра на

Лінії підтримки батьків NUTRICIA

0 800 50 17 85

(дзвінки зі стаціонарних телефонів по Україні безкоштовні)

Nutrilon Кисломолочний вироблений шляхом ферментації закваскою, що містить біфідо- та лактобактерії.

СКЛАД

Знежирене коров'яче молоко – 22,9%, суміш рослинних олій (пальмова, ріпакова, кокосова, високоолеїнова соняшникова, соняшникова), мальтодекстрин – 16,6%, крохмаль кукурудзяний, крохмаль картопляний, лактоза (з коров'ячого молока) – 9,9%, **сироватка молочна суха демінералізована (з коров'ячого молока)** – 7,8%, **концентрат сироватковий (з коров'ячого молока)** – 6,9%, **емульгатор лецитини (соєвий лецитин)**, кальцію гідроксид, калію цитрат, L-аскорбінова кислота, холіну цитрат, магнію хлорид, заліза сульфат, натрію гідроксид, інозитол, таурин, цинку сульфат, уридин 5'-монофосфат і його натрієва сіль, цитидин 5'-монофосфат, нікотинамід, аденозин 5'-монофосфат, інозин 5'-монофосфат і його натрієва сіль, ретинілу ацетат, закваска (*B. breve*, *S. thermophilus*), гуанозин 5'-монофосфат і його натрієва сіль, DL-альфа токоферолу ацетат, D-пантотенат кальцію, сульфат міді, піридоксину гідрохлорид, тіаміну гідрохлорид, рибофлавін, йодид калію, фолієва кислота, марганцю сульфат, філохінон (фітоменадіон), D-біотин, холекальциферол, натрію селеніт, ціанокобаламін.

ТАБЛИЦЯ ПОЖИВНОЇ ЦІННОСТІ

Поживна цінність	Одиниці	на 100 г (g) сухого порошку	на 100 мл (ml) готової суміші
Енергетична цінність	кДж (kJ)	2005	281
	ккал (kcal)	477	67
Жири, з них:	г (g)	21,8	3
- Насичені жири	г (g)	8,9	1,2
Омега-3			
α-ліноленова (ALA)	мг (mg)	552	77
Омега-6			
Ліолева кислота (LA)	мг (mg)	3000	420
Вуглеводи, з них:	г (g)	59,8	8,4
- Цукри, з них:	г (g)	33,4	4,7
- Лактоза	г (g)	31,1	4,4
Білки:	г (g)	10,5	1,5
- Казеїн	г (g)	6,3	0,9
- Сироватковий білок	г (g)	4,2	0,6
Ступінь гідролізу		Частковий	
Мінеральні речовини			
- Натрій (Na)	мг (mg)	144	20
- Калій (K)	мг (mg)	556	78
- Хлор (Cl)	мг (mg)	335	47
- Кальцій (Ca)	мг (mg)	471	66
- Фосфор (P)	мг (mg)	272	38
- Магній(Mg)	мг (mg)	40	5,6
- Залізо (Fe)	мг (mg)	7,4	1
- Цинк (Zn)	мг (mg)	4,2	0,6
- Мідь (Cu)	мкг (µg)	315	44
- Марганець (Mn)	мкг (µg)	67	9,4
- Селен (Se)	мкг (µg)	9,4	1,3
- Йод (I)	мкг (µg)	151	21
Вітаміни			
- Вітамін А	мкг (µg)RE	365	51
- Вітамін D	мкг (µg)	10,3	1,4
- Вітамін Е	мг (mg) α-TE	4,7	0,66
- Вітамін К	мкг (µg)	52	7,3
- Тіамін (B1)	мкг (µg)	496	70
- Рибофлавін (B2)	мкг (µg)	1069	150
- Ніацин (B3)	мкг (µg)	5600	800
- Пантотенова кислота (B5)	мкг (µg)	2462	345
- Вітамін B6	мкг (µg)	550	77
- Фолієва кислота	мкг (µg)	90	13
- Вітамін B12	мкг (µg)	1,3	0,19
- Біотин	мкг (µg)	20	2,8
- Вітамін С	мг (mg)	69	9,7
Інші поживні речовини			
Нуклеотиди	мг (mg)	23	3,2
L-карнітин	мг (mg)	8,6	1,2
Холін	мг (mg)	70	9,8
Інозитол	мг (mg)	32	4,5
Таурин	мг (mg)	20	2,8