

НЕОКЕЙТ ДЖУНІОР

ВІД 1 РОКУ

MACA NETTO: 400 g (г) €

ОПИС

Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей: ентеральне харчування неокейт джуніор / neocate junior від 1 року

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Неокейт Джуніор / Neocate Junior — суміш суха на основі амінокислот, повноцінна. Формула, що містить збалансовану суміш незамінних і замінних амінокислот, вуглеводів, жирів, вітамінів та мікроелементів, забезпечує можливість і безпечність використання продукту у якості єдиного джерела харчування або доповнення до раціону. Нейтральний смак. Для дієтотерапії алергії на білки коров'ячого та соєвого молока у дітей, у випадках полівалентної харчової алергії та інших станів, за яких рекомендовано продукт на основі суміші амінокислот. **Запаковано у захисному середовищі.**

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Перед початком годування дитини необхідно проконсультуватися з лікарем. Тільки для ентерального застосування! Не застосовувати парентерально! Суміш призначена для дітей від 1 року та дорослих. Безумовна перевага у харчуванні дітей раннього віку належить грудному вигодовуванню. Може бути використаним в якості єдиного джерела харчування. Не є лікарським засобом. Необхідно готувати безпосередньо перед споживанням. Не кип'ятити і не використовувати мікрохвильову піч для приготування або розігрівання продукту. Використовувати під медичним наглядом.

ВИРОБНИК

«SHS Інтернешнл Лтд.», бул. Ваверті, 100, Вавертрі Технолоджі Парк, Мерсейсайд, Ліверпуль, L7 9PT, Велика Британія.

ІМПОРТЕР

ТОВ з іноземними інвестиціями “Нутриція Україна”, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корпус 2, м. Київ, 04080, Україна, тел. 0 800 50 17 85 (09:00–19:00, безкоштовно в Україні).

ДОЗУВАННЯ

Має визначатися лише лікарем.

РЕКОМЕНДОВАНИЙ СТРОК СПОЖИВАННЯ

Строк споживання узгоджується з лікарем.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

18 місяців

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Запакований продукт зберігати у сухому і прохолодному місці (від +5 °C до +25 °C). Завжди закривайте банку кришкою після використання. Після першого відкриття щільно закрити кришкою, зберігати у сухому і прохолодному місці (від +5 °C до +25 °C) та використати протягом 2 тижнів.

ФОРМА ВИПУСКУ

Порошко-подібна суміш в металевій банці.
Маса нетто:
400 г (г) €.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СПОЖИВАННЯ

Кількість суміші та її розведення визначається лише лікарем, та залежить від віку, ваги тіла та стану здоров'я дитини.

ЗДОРОВ'Я ВАШОЇ ДИТИНИ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ПРИГОТУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ. ПОРУШЕННЯ СПОСОБУ ПРИГОТУВАННЯ МОЖЕ ЗАВДАТИ ШКОДИ ВАШІЙ ДИТИНІ.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУКЦІЇ З ПРИГОТУВАННЯ



1. Ретельно вимийте руки. Використовуйте чисте обладнання для приготування суміші.
2. Відміряйте необхідну кількість теплої або прохолодної води у ємність.
3. Додайте призначену кількість Neocate Junior у воду. Використовуйте тільки мірну ложку, що додається.
4. Накрийте і збовтайте продукт, поки порошок не розчиниться.
5. Після вживання, решту суміші слід зберігати в холодильнику і використовувати впродовж 24 години після приготування.
6. Збовтайте або перемішайте Neocate Junior безпосередньо перед використанням.

Ккал (kcal) / мл (ml)	0,69	1,00		1,26
Білковий еквівалент	1,94 г (g)	2,91 г (g)	9,71 г (g)	3,88 г (g)
Кількість води	90 мл (ml)	90 мл (ml)	300 мл (ml)	90 мл (ml)
Кількість порошку	2 мірні ложки або 14,6 г (g)	3 мірні ложки або 21,9 г (g)	10 мірних ложек або 73 г (g)	4 мірні ложки або 29,2 г (g)
Приблизний кінцевий об'єм	100 мл (ml)	105 мл (ml)	350 мл (ml)	110 мл (ml)
Осмолярність мосмоль/л (mOsmol/l)	340	520		650

Якщо споживати перорально, Neocate Junior найкраще смакує охолодженим. Заздалегідь приготовану суміш необхідно швидко охолодити, зберігати в холодильнику і використовувати протягом 24 годин після приготування. Час введення суміші через зонд не може перевищувати 4 години.

РЕКОМЕНДОВАНА КОНЦЕНТРАЦІЯ ПРОДУКТУ

Додавайте одну мірну ложку суміші (приблизно 7,3 г (g) порошку) на кожні 30 мл (мл) води, що забезпечуватиме калорійність на рівні 1 ккал (kcal) / мл (ml). Для полегшення переходу від формули Neocate Infant (або іншої суміші) до Neocate Junior, продукт можна розводити до 0,69 ккал (kcal)/ мл (ml). При потребі та за умови переносимості, Neocate Junior можна споживати концентрованишим — 1,26 ккал (kcal) / мл (ml). Вода або додаткова рідина повинні пропонуватися одночасно з Neocate Junior, щоб забезпечити достатнє споживання рідини.

РОЗРАХУНОК ПОТРІБНОЇ КІЛЬКОСТІ ПРОДУКТУ

Ваш малюк може потребувати менше або більше продукту, ніж це показано в рекомендованій таблиці дозування. Звертайтеся за порадами до лікаря в разі виникнення запитань.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ГІГІЄНИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ

Тривалий або частий контакт напоїв та їжі із зубами збільшує ризик карієсу, тому якісна гігієна ротової порожнини важлива для немовлят та дітей. Слідкуйте за першими зубками малюка, особливо перед сном. При необхідності проконсультуйтеся з вашим лікарем-педіатром або стоматологом.

СКЛАД

Сироп глюкозний сухий, рафіновані рослинні олії (середньооланцюгові тригліцериди (пальмова та/або кокосова олія), високоолеїнова соняшникова, канола, соняшникова), L-серин, L-глутамін, мальтодекстрин, гліцин, L-аланін, L-лейцин, ацетат L-лізину, L-треонін, трикалій цитрат, L-тирозин, емульгатор (ефіри лимонної кислоти моно- та дигліцеридів жирних кислот), L-валін, L-ізолейцин, кальцій фосфат двозаміщений, магній хлорид, L-пролін, динатрій гідрофосфат, кальцій карбонат, L-цистин, L-гістидин, L-фенілаланін, дикалій гідрофосфат, L-метіонін, L-аргінін, натрій хлорид, холін бітарtrat, L-триптофан, трикальцій цитрат, L-аскорбінова кислота, кальцій хлорид, антиоксиданти (соняшниковий лецитин, аскорбіл пальмітат), таурин, міо-інозитол, сульфат заліза, L-карнітин, сульфат цинку, DL-альфа токоферол ацетат,нікотинамід, кальцій D-пантотенат, сульфат міді, рибофлавін, сульфат марганцю, тіамін гідрохлорид, піридоксин гідрохлорид, вітамін А ацетат, калій йодид, фолієва кислота, натрій молібдат, хлорид хрому, натрій селеніт, фітоменадіон, D-біотин, холекальциферол, ціанокобаламін. **Без ГМО.**

ТАБЛИЦЯ ПОЖИВНОЇ ЦІННОСТІ

	Одиниці	На 100 g(r) сухого порошку	На 100 ml(мл) ¹ готової суміші
Енергетична цінність	kJ (кДж)/ kcal (ккал)	1992/ 475	420/ 100
Жири, з них:	g (г)	22	4,6
Насичені	g (г)	9,4	2,0
Середньооланцюгові тригліцериди	g (г)	7,4	1,6
Мононенасичені	g (г)	7,7	1,6
Поліненасичені	g (г)	4,0	0,84
Вуглеводи, з них:	g (г)	56,0	11,8
Цукри ²	g (г)	5,0	1,1
Лактоза	g (г)	0	0
Полісахариди	g (г)	45,4	9,6
Харчові волокна	g (г)	0	0
Білковий еквівалент	g (г)	13,3	2,8
Сіль ³	g (г)	0,71	0,15

Мінеральні речовини	Одиниці	На 100 g(r) сухого порошку	На 100 ml(мл) ¹ готової суміші
Натрій	mg (мг)	285	60,1
Калій	mg (мг)	546	115
Хлориди	mg (мг)	437	92,2
Кальцій	mg (мг)	428	90,3
Фосфор	mg (мг)	309	65,2
Магній	mg (мг)	66,5	14,0
Залізо	mg (мг)	5,7	1,2
Мідь	mg (мг)	0,48	0,10
Цинк	mg (мг)	5,2	1,1
Марганець	mg (мг)	0,29	0,06
Йод	µg (мкг)	71,3	15,0
Молібден	µg (мкг)	21,4	4,5
Селен	µg (мкг)	15,2	3,2
Хром	µg (мкг)	7,6	1,6

Вітаміни	Одиниці	На 100 g(r) сухого порошку	На 100 ml(мл) ¹ готової суміші
Вітамін А	µg RE (мкг RE)	214	45,2
Вітамін D3	µg (мкг)	6,2	1,3
Вітамін Е	mg α-TE (мг α-TE)	6,7	1,4
Вітамін К1	µg (мкг)	19,0	4,0
Тіамін (В1)	mg (мг)	0,48	0,10
Рибофлавін (В2)	mg (мг)	0,95	0,20
Ніацин (преформований)	mg (мг)	5,3	1,1
Ніацин (включаючи триптофан)	mg NE (мг NE)	9,0	1,9
Пантотенова кислота(В5)	mg (мг)	1,9	0,40
Вітамін В6	mg (мг)	0,48	0,10
Біотин	µg (мкг)	14,3	3,0
Фолієва кислота	µg (мкг)	71,3	15,0
Вітамін В12	µg (мкг)	1,2	0,25
Вітамін С	mg (мг)	47,5	10,0
Холін	mg (мг)	95,0	20,0
Інозитол	mg (мг)	26,1	5,5

Інше	Одиниці	На 100 g(r) сухого порошку	На 100 ml(мл) ¹ готової суміші
L-карнітин	mg (мг)	15,8	3,3
Таурин	mg (мг)	31,45	6,6
Осмолярність	mOsmol/l (мОсмоль/л)		520
Осмоляльність	mOsmol/l (мОсмоль/л)		600

¹при рекомендованому розведенні 21,1 г (g) / 100 мл (ml).

²не містить лактози та галактози.

³зумовлено вмістом натрію природного походження.